

Carcinoma diferenciado de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos

Publicado: Martes, 30 Noviembre -0001 00:00

Escrito por: Sofia

Visitas: 3986

Â

â™€ 51 aÃ±os

â€¢ Motivo de consulta: Seguimiento y tratamiento de bocio multinodular con nÃ³dulo en LI con PAAF Bethesda V

â€¢ Antecedentes personales: G2C2, ataques de pÃ¡nico

â€¢ Antecedentes familiares: No tiroideopatÃa, no DBT

â€¢ MedicaciÃ³n: Paroxetina

â€¢ Examen fÃsico: ClÃnicamente eutiroidea, tiroides y adenopatÃas no palpables

Â

Â

Estudios iniciales

EcografÃa tiroidea:

LI nÃ³dulo hipoecoico sÃ³lido con microcalcificaciones de 13 mm (diÃ¡metro mayor)

D nÃ³dulos isoecoicos bordes regulares de 6 y 7 mm

Debajo del LI adenomegalia 12 mm con alteraciÃ³n de su estructura

Â

PAAF:

NÃ³dulo LI Bethesda V sospechoso de carcinoma papilar

Adenomegalia 12 mm: MTS carcinoma papilar; Tg en lavado de aguja 200 ng/ml

Carcinoma diferenciado de tiroides

Categoría: Casos clínicos interactivos

Publicado: Martes, 30 Noviembre -0001 00:00

Escrito por: Sofia

Visitas: 3986

Laboratorio: TSH 1,95 mcUI/mL, T4L 0,92 ng/dl, **aTg 879 UI/ml**, aTPO 19 UI/ml

Â

(ContinuÃ; el caso clÃnico haciendo clickÂ [aquÃ](#))