

¿Cómo elegimos el GLP más apropiado para nuestros pacientes?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 30 Noviembre -0001 00:00

Escrito por: Sofia

Visitas: 3675

Â

Â¿CÃ³mo elegimos el GLP mÃ¡s apropiado para nuestros pacientes?

Con todo el entusiasmo por los agonistas del GLP-1, puede resultar difÃ­cil elegir cual utilizar. Ante todo tenemos que determinar si trataremos al paciente por diabetes tipo 2 o por obesidad. Muchos agonistas del GLP-1 estÃ¡n disponibles en una versiÃ³n para la diabetes y en otra para el control crÃ³nico del peso o la obesidad. Si un paciente tiene diabetes y obesidad, puede recibir cualquiera de los dos. Si un paciente sÃ³lo tiene diabetes pero no obesidad, se le debe prescribir la versiÃ³n para diabetes. Para la obesidad sin diabetes, tendemos a seguir con los medicamentos indicados para el control crÃ³nico del peso.

Veamos las diferentes opciones en detalle:

Exenatida: En orden cronolÃ³gico de aprobaciÃ³n, la exenatida fue el primer fÃ¡rmaco GLP-1 que se utilizÃ³ para la diabetes (se presentaba con 2 opciones, Bydureon y Byetta). Ambos ya no se encuentran en el mercado Argentino. Estos medicamentos eran inconvenientes porque requerÃ¡an inyecciones dos veces al dÃ­a y causaban nÃ¡dulos dolorosos en el lugar de la inyecciÃ³n.

Liraglutida: EstÃ¡ dentro de los medicamentos mÃ¡s utilizados para la diabetes tipo 2. Es una inyecciÃ³n diaria y tiene varias dosis para seleccionar. Siempre comenzamos con una dosis baja y se va aumentando segÃºn la tolerancia y el efecto deseado en la HbA1c. Victoza se utiliza para diabetes y tiene una contraparte para la obesidad llamada Saxenda. El ensayo SCALE demostrÃ³ una pÃ©rdida de peso del 8% al 12% con Saxenda.

Semaglutida: La llegada de las inyecciones semanales generÃ³ mucho entusiasmo. Ozempic es eficaz para tratar la diabetes. La contraparte del medicamento para bajar de peso se llama Wegovy, que viene en una lapicera diferente. Si bien todos estos agonistas de GLP-1 estÃ¡n indicados para tratar la diabetes tipo 2 o para controlar el peso, Wegovy tiene una indicaciÃ³n especial que ninguno de los demÃ¡s tiene. En marzo de 2024, Wegovy adquiriÃ³ una indicaciÃ³n para disminuir el riesgo cardÃ¡aco en personas con un IMC â¥ 27 y antecedentes cardÃ¡acos previos. Esto realmente cambiarÃ¡ la accesibilidad de este medicamento porque se espera que los pacientes con enfermedades cardÃ¡acas tengan un mayor acceso a Wegovy.

Tirzepatida. Otra inyecciÃ³n semanal para el tratamiento de la diabetes tipo 2 se llama Mounjaro. Su contraparte para el control de peso se llama Zepbound, que mostrÃ³ una pÃ©rdida de peso de alrededor

¿Cómo elegimos el GLP más apropiado para nuestros pacientes?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 30 Noviembre -0001 00:00

Escrito por: Sofia

Visitas: 3675

del 20,9% en 72 semanas. Añon no estñ disponibles en Argentina.

Estos medicamentos tienen efectos secundarios similares en diferentes grados, pero los más frecuentes son náuseas, cambios en las heces, dolor abdominal y reflujo.

Â

Copyright 2024. Endoweb.net

Â