

## ¿Existe algún vínculo entre la aparición de cáncer de tiroides y de mama?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 04 Octubre 2022 12:08

Escrito por: Sofia

Visitas: 4089

---

Â

Â Esta revisiÃ³n propone varios mecanismos fisiopatolÃ³gicos que responden este interrogante y alientan nuevas opciones terapÃ©uticas para estas enfermedades.

Â

Â

Hormonal Crosstalk Between Thyroid and BreastÂ Cancer

InterrelaciÃ³n hormonal entre el cÃ¡ncer de tiroides y el cÃ¡ncer de mama

Â

*Halada S. et al, Endocrinology 2022: 163, 1â 15*

Â

### **Puntos de interÃ©s:**

En la actualidad es cada vez mÃ¡s numerosa la evidencia que interconecta la patogÃ©nesis del cÃ¡ncer de tiroides y el de mama. En esta revisiÃ³n se detallan los mecanismos que relacionan ambas patologÃ­as y se plantean nuevas opciones terapÃ©uticas derivadas de los mismos.

### **Resumen:**

El cÃ¡ncer diferenciado de tiroides y el de mama representan una significativa proporciÃ³n de los tumores endÃ³crinos que afectan principalmente a mujeres. Como tejidos hormonales, la mama y la tiroides comparten seÃ±ales endÃ³crinas. Las cÃ©lulas mamarias responden a las seÃ±ales de las hormonas tiroideas y se ven afectadas por la alteraciÃ³n de sus niveles. Las cÃ©lulas tiroideas responden a las hormonas sexuales, sobre todo estrÃ³genos, los que desarrollan procesos pro tumorigÃ©nicos a travÃ©s de su estÃ­mulo. Las hormonas tiroideas y sexuales tambiÃ©n desarrollan una interrelaciÃ³n a nivel transcripcional que influencia la oncogÃ©nesis y la sensibilidad a los tratamientos. Las alteraciones relacionadas a la obesidad (producciÃ³n de estrÃ³genos por los adipocitos, inflamaciÃ³n, desregulaciÃ³n hormonal relacionada a la ingesta y sÃ­ndrome metabÃ³lico) promueven alteraciones tanto en el tejido mamario como tiroideo. Los tÃ³xicos ambientales alteran el sistema endÃ³crino, incluyendo la homeostasis tiroidea y mamaria, e influyen procesos patolÃ³gicos en ambos

## ¿Existe algún vínculo entre la aparición de cáncer de tiroides y de mama?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 04 Octubre 2022 12:08

Escrito por: Sofia

Visitas: 4089

---

Órganos a través de su acción mimética hormonal. En esta revisión, se discuten las conexiones hormonales entre la mama y la tiroides y las perspectivas sobre el tratamiento hormonal para el cáncer de mama (CM) y el cáncer de tiroides (CT). Investigaciones futuras deberán esforzarse en conocer y explorar la interrelación hormonal entre estos tejidos en un esfuerzo de entender la prevalencia de CM y CT en mujeres e identificar opciones terapéuticas potenciales.

### Contexto:

El CM y el CT son de las neoplasias más frecuentes en mujeres con 84,8 nuevos casos y 23,1 por 100.000 habitantes anualmente y respectivamente en América del Norte. De los tumores en mujeres a nivel mundial, el CM y el CT ocupan el primero y onceavo lugar respectivamente. Ambos tumores tienen una significativa diferencia de géneros, las mujeres tienen 100 veces mayor riesgo de CM y 2,9 veces mayor riesgo de CT que los hombres. La tasa de incidencia tanto de CM como de CT se ha incrementado en las últimas décadas con un aumento de 1,9 del CM (en mujeres entre 25-39 años) y de 2,9 del CT. La morbilidad combinada y el incremento de la prevalencia de estas neoplasias requiere una investigación continua de las causas y de la susceptibilidad biológica. Estudios observacionales y epidemiológicos identifican un incremento del riesgo bidireccional entre el CM y la disfunción tiroidea o el CT. **Estudios en sobrevivientes de CM sugieren un incremento de 1,55 veces en el riesgo de desarrollar CT, y un incremento de 1,32 veces de riesgo de desarrollar CM en sobrevivientes de CT, en relación a la población general.** Los receptores hormonales y el receptor HER2 están elevados en estos casos sugiriendo una conexión hormonal entre las neoplasias mamarias y tiroideas. Raramente se presentan de modo sincrónico generando un debate en el rol de las hormonas, la genética y la exposición a la radiación en su co-desarrollo. Diferentes mecanismos biológicos influyen el riesgo mutuo de CM y CT. La radiación y los quimioterápicos alquilantes son factores de riesgo de segundos tumores. Otras teorías incluyen drivers genéticos compartidos por ejemplo aquellos vinculados al síndrome de hamartoma por homólogos de fosfato y tensina eliminados en el cromosoma diez (PTEN), referido antes como enfermedad de Cowden. Sin embargo, a pesar de compartir componentes hormonales en relación al sistema hipotálamo-hipofisario, la mama y la tiroides son comúnmente vistos como tejidos endocrinos separados.

### Conexiones clínicas y fisiológicas:

*Señalización tiroidea:* La mama responde a las hormonas tiroideas. El hipertiroidismo se ha asociado a un riesgo incrementado de CM mientras

## ¿Existe algún vínculo entre la aparición de cáncer de tiroides y de mama?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 04 Octubre 2022 12:08

Escrito por: Sofia

Visitas: 4089

---

que el efecto del hipotiroidismo aún no es claro. **Niveles elevados de T4 libre se asocian con el riesgo de desarrollar diversos tumores sólidos, entre ellos CM.** La T4 influencia la respuesta inmunológica al CM, aún en ausencia de receptores hormonales positivos. Diversos estudios relacionan enfermedades tiroideas benignas (autoinmunes o no) con el CM. Los autoanticuerpos tiroideos son predictores independientes del CM (anticuerpos anti tiro peroxidasa y anticuerpos contra el receptor de TSH). El tejido mamario normal y el tumoral expresan receptores análogos a estos anticuerpos y tendrán reacción cruzada a los mismos. **El tejido mamario benigno expresa el transportador yodo-sodio o NIS** y por ende capta radioyodo, con datos inconclusos sobre su riesgo incrementado en el desarrollo de CM.

*Señalización mamaria:* El tejido mamario es un target de la acción hormonal de estrógenos y progesterona. Al igual que este, **el tejido tiroideo, tanto benigno como maligno, es sensible a la acción estrogénica.** El hiperestrogenismo endógeno durante la vida reproductiva se ha asociado con un incremento en la prevalencia de CT en mujeres. Sin embargo, el uso de terapia hormonal de reemplazo o anticonceptivos con estrógenos no están relacionados con CT. Además, **los estrógenos marcarán la co-ocurrencia de enfermedades tiroideas autoinmunes y CM,** que predominantemente afectan a las mujeres. La tolerancia inmune y el desarrollo de autoinmunidad están regulados por el gen AIRE. A su vez, los estrógenos son reguladores centrales de este gen. Una elevación de estrógenos genera una reducción de la actividad de este gen, contribuyendo a la susceptibilidad hacia a la autoinmunidad.

*Obesidad:* Junto al incremento en la incidencia de CT y CM, ha habido un incremento de la incidencia de obesidad. Esta enfermedad está relacionada a mayor riesgo de CT y CM. Existen varias modificaciones hormonales en pacientes con obesidad tales como aumento en la actividad aromatasa del tejido adiposo (con la consiguiente producción de estrógenos), alteración de la señalización de citoquinas, inflamación de bajo grado y alteraciones metabólicas. Las mismas están asociadas con CM y CT. La obesidad está asociada con mayor expresión de la ciclooxigenasa 2 de los macrófagos que estimula la producción de estrógenos por los adipocitos. En pacientes hipotiroideos, existe una disminución en los niveles de globulina ligadora de andrógenos y estrógenos lo que contribuye a niveles más elevados de estrógenos y andrógenos libres. Este incremento en los niveles de estrógenos relacionado a la acumulación de adipocitos podría ser la conexión entre el CT y el CM. Por otra parte, los adipocitos funcionan como células hormonalmente activas que producen y responden a las adipoquinas. La desregulación de las mismas está asociada a CT y CM. En pacientes con obesidad existe una sobreproducción de leptina que estimula la proliferación celular y

## ¿Existe algún vínculo entre la aparición de cáncer de tiroides y de mama?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 04 Octubre 2022 12:08

Escrito por: Sofia

Visitas: 4089

---

la carcinogénesis en tejidos que no son blanco habitual de esta hormona. **La resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6 y 18 están sobre producidas en la obesidad. Estas adipoquinas promueven el desarrollo de CT y CM a través del reclutamiento de fibroblastos vinculados al cáncer, cambios en el microambiente celular y efectos directos.** Por otra parte, algunas de ellas promueven la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina interactuando con el tejido tiroideo y mamario, promoviendo cambios metabólicos y procesos oncogénicos. La obesidad produce un fenotipo inflamatorio de bajo grado debido a cambios inmunológicos ocasionados por el tejido adiposo y elevación de citoquinas proinflamatorias. **La elevación de la insulina y su resistencia están relacionadas al CT y al CM. La IGF-1 se altera en pacientes obesos y su elevación se ha asociado con el CM y el CT.** Una alteración en la señalización de IGF-1 conduce a una activación de las vías MAPK y AKT tanto en la tiroides como en la mama, lo que lleva a la proliferación y migración de células tumorales.

*Disruptores endocrinos:* **Los disruptores endocrinos que imitan a los estrógenos como el bisfenol A y el genistein están asociados a un incremento del CT y CM, alterando sus señales fisiológicas.** Existen además muchos disruptores endocrinos conocidos relacionados al CT tales como ftalatos o pesticidas y que tienen impacto en el desarrollo de CM.

*Hormonas tiroideas y CM:* **Los receptores nucleares de hormonas tiroideas  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_1$  y  $\beta_2$  están presentes en las células del CM. El receptor  $\beta_2$  genera un *downregulation* del  $\beta_1$ . La presencia del receptor  $\beta_2$  es un marcador de buen pronóstico en CM. A su vez, la expresión del receptor  $\beta_1$  se ha asociado con efectos protectores al CM tanto *in vitro* como *in vivo*. La activación del receptor  $\beta_2$  por T3 se ha asociado con una atenuación de las vías JAK-STAT y RUNX2, reduciendo el potencial metastásico en CM. Por tanto, T3 podría tener efectos pro y antitumorales sobre el tejido mamario a través de su efecto genómico. Sin embargo, el efecto principal aún no es del todo claro. Las acciones no genómicas de las hormonas tiroideas están mediadas por la proteína de membrana  $\beta_3$ . Su unión a la subunidad S1 media la activación de la vía PI3K/Akt mientras que la unión de hormonas tiroideas a la subunidad S2 activa la vía MAPK/ ERK1/2. Esta última vía media la migración, proliferación y angiogénesis celular. La activación de la integrina  $\beta_3$  por las hormonas tiroideas está implicada entonces en la tumorigénesis de diversas neoplasias, incluyendo el CM. En cultivos celulares de CM hay expresión de  $\beta_3$  que está asociada a la presencia de metástasis y diseminación linfática. A su vez, los metabolitos de hormonas tiroideas, tales como T3reversa (T3r), T2 o ácido tetrayodoacético (tetrac) tienen efectos sobre la integrina  $\beta_3$ . T2 y T3r estimulan**

## ¿Existe algún vínculo entre la aparición de cáncer de tiroides y de mama?

Categoría: Publicaciones destacadas

Publicado: Martes, 04 Octubre 2022 12:08

Escrito por: Sofia

Visitas: 4089

---

la activación de  $\text{p38}$ , generando proliferación de las líneas celulares de CM y cáncer de ovario. Incluso en el tejido mamario maligno, hay una sobreexpresión de deiodinasa tipo 3 que estimulará la producción de T3r y T2 generando un ambiente pro tumoral. Por su parte, **el tetrac tendrá un efecto opuesto, antitumoral, disminuyendo la proliferación celular y la angiogénesis y aumentando la apoptosis, inhibiendo la integrina  $\text{p38}$ .**

*Hormonas sexuales y CT:* Diferentes estudios y revisiones hablan del **efecto estrogénico sobre el desarrollo y progresión del CT. Los estrógenos se unen a dos receptores nucleares  $\text{ER}$  y  $\text{ER}$ , ambos sobre expresados en células de CT. La unión con el receptor alfa produce angiogénesis, proliferación y migración de células tumores, mientras que la activación del receptor beta induce un efecto anti proliferativo.** El ratio alfa/beta suele ser mayor y esto es lo que induce el efecto estrogénico sobre la tumorigénesis tiroidea. **El receptor estrogénico alfa se localiza tanto en la membrana/citoplasma como a nivel nuclear. Por su acción a nivel de membrana, este receptor activa las vías MAPK, AKT/mTOR y MEK1/2. El receptor nuclear induce la transcripción de proteínas relacionadas a la proliferación y regula la actividad del PPAR $\gamma$ .** Por otra parte, el efecto de los estrógenos sobre las células tiroideas puede ser indirecto, aumentando la sensibilidad de TSH sobre su receptor y por ende su efecto proliferativo sobre los tirocitos. **A su vez, la activación de la vía MAPK estimulada por estrógenos reducirá la expresión del NIS en las células tiroideas tumorales,** si bien esto debe ser confirmado. El efecto de la progesterona y los andrógenos sobre el CT aún es desconocido.

*Interconexiones entre los receptores nucleares de tiroides y de hormonas sexuales:* Ambas se unen a receptores nucleares que pertenecen a una misma superfamilia. Los reguladores de ambos receptores (tanto co-represores como co-activadores) son compartidos. Además, la especificidad de estos receptores es baja, por lo cual pueden unirse a diversas hormonas. Mutaciones de los co-reguladores de ambos tumores darán origen al CT y al CM.

### Consideraciones terapéuticas:

*Efecto de las hormonas tiroideas sobre el CM:* La dronedarone antagoniza el efecto protumorigénico del receptor de hormonas tiroideas  $\text{TR}$ , con un efecto citotóxico sobre líneas celulares de CM. También se considera el uso de agonistas del receptor beta por su efecto anti proliferativo. Se ha propuesto el uso de ácido retinoico o agonistas de su receptor por la interrelación entre el mismo con los receptores nuclear de hormonas tiroideas y estrógenos. Otra vía de tratamiento será la inhibición de la proteína de membrana  $\text{p38}$ .

## ¿Existe algún vínculo entre la aparición de cáncer de tiroides y de mama?

Categoría: Publicaciones destacadas  
Publicado: Martes, 04 Octubre 2022 12:08  
Escrito por: Sofia  
Visitas: 4089

---

De hecho, el tetrac bloquea esta vía. Se ha propuesto también el uso de inhibidores de esta integrina como el cilengitide o el uso de radionuclótidos para bloquearla. Por su parte, las células del CM expresan NIS. Se podría pensar en el uso de agentes que aumenten dicha expresión en las células mamarias y no a nivel tiroideo, favoreciendo el uso de radioyodo para el tratamiento del CM avanzado.

*Efecto de las hormonas sexuales sobre el CT:* El erteberel es un agonista del receptor beta de estrógenos que tendrá un efecto anti proliferativo sobre el CT. Los antagonistas del receptor alfa serán de utilidad por su efecto anti tumoral. No se conoce aún el efecto del tamoxifeno, raloxifeno o del fulvestrant sobre el CT. Se podría pensar en el uso de antagonistas de los receptores de estrógenos para optimizar la captación de radioyodo por el NIS.

*Obesidad:* La metformina para el tratamiento adyuvante del CM ha reportado pocos beneficios, mientras que si lo ha hecho en CT. También se considera el uso de inhibidores de adipoquinas (como IL-6) en modelos animales de CM avanzado. No ha sido estudiado el efecto de los inhibidores de aromatasa sobre el CT.

Conclusiones: Numerosas hormonas incluyendo las tiroideas, sexuales, las liberadas por los adipocitos y los disruptores endócrinos influyen la patogénesis del CM y el CT. Si bien a través de la interrelación de estas hormonas se amplían las opciones terapéuticas, deberíamos ser conscientes de las consecuencias no deseadas de estos agentes clínicos. Se requieren más estudios para mejorar nuestra comprensión sobre la relación entre la mama y la tiroides. Esto permitirá el desarrollo de nuevos tratamientos, reducir los efectos indeseados y limitar los efectos adversos del tratamiento convencional.

Â

Â

Copyright 2022. Endoweb.net

Â

Â